



E n c u e s t a
Papiloscopia

ENCUESTA PILOTO SOBRE LA SITUACIÓN DEL MANEJO DEL VPH EN ESPAÑA EN 2018 EN PACIENTES MAYORES DE 30 AÑOS

JUSTIFICACIÓN

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en todo el mundo, llegando a afectar hasta un 90% de las mujeres sexualmente activas. La gran mayoría de pacientes elimina la infección de forma espontánea. Sin embargo, hay un porcentaje de mujeres en el cual el VPH persiste, provocando lesiones que pueden progresar hacia cáncer cervical, el segundo cáncer más frecuente en mujeres jóvenes en Europa.

Procare Health colabora, junto con médicos y pacientes, en el desarrollo clínico de tratamientos novedosos como **PAPILOCARE®** - el 1^{er} tratamiento para prevenir y tratar las lesiones cervicales causadas por el VPH - y en profundizar el conocimiento de la infección por VPH y sus consecuencias.

La Encuesta Papiloscopia pretende entender mejor la práctica clínica en el manejo de la infección por VPH de los especialistas en España, con el fin de mejorar las soluciones terapéuticas y la sensibilización de las pacientes.

OBJETIVO: Conocer la opinión de los especialistas sobre la situación del manejo del VPH en España en 2018 en pacientes mayores de 30 años.

DISEÑO Y TIPO DE MÉDICOS: Encuesta de 20 preguntas (menos de 10 minutos para rellenar), con varias respuestas posibles, realizada a 150 especialistas que visitan a mujeres VPH+ con frecuencia.

Autorizo a que **Procare Health S.L.** pueda realizar un tratamiento de los datos contenidos en esta encuesta con fines estadísticos.

Dr/a:

Centro de trabajo:

Firma:

1. ¿Cuántos resultados citológicos evalúa usted aproximadamente cada mes?

De estos, ¿Qué porcentaje son?:

- Normales?: _____ % - Anormales no relacionados con VPH?: _____ %

- Anormales relacionados con VPH?: _____ %

2. Ante una citología anormal y tras la explicación pertinente a la paciente, ¿Al cabo de cuánto tiempo realiza usted la siguiente visita de seguimiento?

_____ meses

3. ¿Qué pasos sigue tras recibir una citología de LSIL? (varias respuestas posibles)

Colposcopia inmediata Prueba VPH Biopsia Tratamiento con Papilocare®

4. Ante una citología ASCUS, ¿Realiza usted un test de VPH para pacientes mayores de 30 años)?

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

5. ¿Cree usted que ante una citología de LSIL debe indicarse Papilocare®?

Sí No Si no, ¿Por qué? _____

6. ¿Con qué frecuencia realiza usted una conización ante un CIN I?

Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

7. ¿Cuánto tiempo de persistencia promedio un CIN I puede transcurrir en un CIN II/CIN III según tu experiencia?

6 meses 1 año 2 años 3 años más

8. En su práctica clínica ¿Qué porcentaje de las pacientes mayores de 30 años, en promedio, persisten con el VPH más de 6 meses?

_____ %

9. En su práctica clínica ¿Qué porcentaje de las pacientes con un CIN I van a presentar una regresión espontánea de la lesión a los 6 meses, 12 meses, 18 meses, 24 meses?

6 meses: _____ %

18 meses: _____ %

12 meses: _____ %

24 meses: _____ %

10. Ante una colposcopia con sospecha de lesión por VPH, ¿Realiza usted automáticamente una biopsia?

- Sí, siempre Depende del grado de la lesión Nunca

11. ¿Realiza usted fotografías de las imágenes colposcópicas?

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

12. ¿Es preocupante el estrés generado en la paciente cuando se le explica que tiene el VPH?

- Sí No Si no, ¿Por qué? _____

13. ¿Qué protocolo de acción realiza ante una infección por VPH ?

- Informar a la paciente sobre la infección

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

- Aconsejar medidas higiénicas

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

Especificar: _____

- Prescribir algún tipo de producto / medicación

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

Especificar: _____

- Prescribir ansiolíticos (para el estrés)

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

Especificar: _____

14. ¿Ha utilizado usted Papilocare® en alguna paciente?

- Sí No
Si no, ¿Por qué? _____

15. ¿Ha constatado usted una mejoría en el proceso de curación de las lesiones en las mujeres tratadas con Papilocare®?

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

16. ¿Cuándo utiliza usted principalmente Papilocare®? (Varias respuestas posibles)

- Tras una conización
 Ante una citología ASCUS
 Ante una citología LSIL
 Ante una citología HSIL

Otras _____

17. ¿En su opinión, la paciente cumple con el tratamiento con Papilocare®?

- Siempre Frecuentemente Ocasionalmente Nunca

18. ¿Cuál es la satisfacción de la paciente con el tratamiento de Papilocare®?

- Excelente Buena Moderada Mala

19. ¿Cree usted que Papilocare® tranquiliza a su paciente?

- Sí No
Si no, ¿Por qué? _____

20. ¿Cree usted que Papilocare® es la única opción terapéutica no invasiva validada clínicamente?

- Sí No
Si no, ¿Por qué? _____

¿Cuáles son las otras opciones?

CONCURSO DE IMÁGENES COLPOSCÓPICAS

El concurso de la encuesta **PAPILOSCOPIA** es un concurso de imágenes colposcópicas de las lesiones cervicales provocadas por VPH antes, durante y después del tratamiento con **PAPILOCARE®** y/o conización.

OBJETIVO: El objetivo del concurso es publicar un libro con las imágenes colposcópicas para mejorar el conocimiento del seguimiento y del tratamiento del VPH.

DISEÑO Y TIPO DE MÉDICOS: El concurso es opcional y los especialistas que deseen participar deben enviar las imágenes al delegado **Procare Health** de su área, acompañadas de la descripción de las lesiones y del tiempo de tratamiento (en días).

PREMIO: El ganador del concurso será galardonado con un **FULL PACK** de participación a un congreso nacional, además de escribir una “opinión de experto” publicada en el libro.

RESULTADO: El resultado será divulgado a partir de abril 2019.

¿Desearía usted participar en el concurso? Sí No