

# Caso 1

**Mujer menor de 30 años de edad  
con VPH presente: Manejo**

**Dr. Luis Serrano**

- 23 años
- No fumadora
- Nuligesta
- **Citología Negativa**

## Motivo de consulta

- Enviada para colposcopia por VPH+: 31,35

## ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

1. La paciente esta bien incluida en protocolo de cribado.
2. La determinación viral es el cribado electivo en este caso.
3. La paciente no debe ser remitida a colposcopia.

- No se debe iniciar cribado antes de los 25 años.
- Entre los 25 y los 30 años, el cribado se debe limitar a la realización de la citología.
- En pacientes menores de 30 años, la prevalencia del VPH es muy alta, debido a infecciones transitorias, por lo que la determinación viral no es útil para predecir la patología y no debe hacerse.

Además... la positividad viral NO debe llevar directamente a colposcopia

**Citología Negativa + VPH Positivo**

Solo colposcopia si...

O si... se dispone de pruebas moleculares positivas

VPH Positivo de nuevo al año




Tipaje 16/18

ARNm E6/E7

P16/Ki67

**COLPOSCOPIA**



## Colposcopia



- Satisfactoria, ZTT1.
- Lesión acetoblanca débil, extensa, periférica, de bordes geográficos, entre las 9 y las 3 horarias, con áreas de mosaico fino, algo más intensa entre las 12 y las 2 horarias y en posición más central.
- Compatible cambios menores.
- Se realiza biopsia: LIE-BG.





## ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

1. Debemos hacer un nuevo control cito/colposcópico en 6 meses.
2. Debemos realizar un co-test al año.
3. Debemos usar procedimiento destructivo de la lesión (crioterapia/electrocoagulación).

## Co-test al año resultó negativo

Las pacientes con LIE-BG histológico y citología inferior a LIE-AG tienen una probabilidad de entre el 4-13% de desarrollar una lesión de alto grado en los siguientes 24 meses y prácticamente nula de desarrollar invasión.



# Discusión / Manejo LIE-BG histológico


(Tras citología previa LIE-BG o inferior)

**OPCIÓN PREFERIDA**

**Co-test a los 12 meses**


**OPCIÓN ACEPTABLE**

**Citología/Colposcopia anual**




## Empleo gel vaginal basado en coriolus versicolor 6 meses

Normalización de lesiones con colposcopia concordante a los 3 meses y a los 6 meses vs control



Aclaramiento viral a los 6 meses



## ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta?

1. El test de VPH es útil en todas las franjas etarias.
2. Es especialmente útil en citologías LIE-BG en pacientes post-menopáusicas.
3. No tiene utilidad como seguimiento de la paciente ya tratada.

La determinación de VPH en mujeres sin indicación origina confusiones

### **SOLO** indicada en:

- Cribado a partir de 30 años.
- Seguimiento de citologías anormales.
- Triage ante resultados citológicos anómalos: ASC-US > 25; LIE-BG > 50 años.
- Control de pacientes tratadas.

## Impacto psicológico

1. Sensación de **Enfermedad**
2. Sentimientos de **Culpa**
3. Ideas de **Impureza**
4. **Rechazo** a la **Vida de Relación**
5. **Problemas de Pareja**
6. **Daños Psicológicos** de larga duración